

ISAR – Screening: Identification of Seniors at Risk.

Bei welchen Patienten sollte bei Klinikaufnahme an eine akutgeriatrische Behandlung gedacht werden? Bitte jede Frage mit Ja oder Nein beantworten: Das Screening ist positiv bei 2 oder mehr Punkten.

Bitte jede Frage mit JA oder NEIN beantworten.

Hilfebedarf	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN	1 0
1. Waren Sie vor der Erkrankung oder Verletzung, die Sie in die Klinik geführt hat, auf regelmäßige Hilfe angewiesen?		
Akute Veränderung des Hilfsbedarfs	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN	1 0
2. Benötigten Sie in den letzten 24 Stunden mehr Hilfe als zuvor?		
Hospitalisation	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN	1 0
3. Waren Sie innerhalb der letzten 6 Monate für einen oder mehrere Tage im Krankenhaus?		
Sensorische Einschränkung	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN	1 0
4. Haben Sie unter normalen Umständen erhebliche Probleme mit dem Sehen, die nicht mit einer Brille korrigiert werden können?		
Kognitive Einschränkungen	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN	1 0
5. Haben Sie ernsthafte Probleme mit dem Gedächtnis?		
Multimorbidität	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN	1 0
6. Nehmen Sie pro Tag sechs oder mehr verschiedene Medikamente ein?		

Summe: _____